

Kankerzorg in het ziekenhuis of op een andere plek, wat vind jij? (deel 1)


‘Deskundigheid in het toedienen is voor mij belangrijk. Als dat op een andere locatie ook kan, vind ik dat prima.’

Bron: landelijke Doneer Je Ervaring-peiling, van NFK en haar lidorganisaties, juni 2024
Lees de volledige resultaten op doneerjevervaring.nl.

Het panel van en voor kankerpatiënten
doneer je ervaring

Een initiatief van **nfk**

Aan deze peiling deden **6238** mensen mee die kanker hebben of hadden.



De meeste respondenten kregen een medicijnbehandeling via infuus (92%) of katheter (90%) in het ziekenhuis van behandeling. Injecties werden bijna net zo vaak in het ziekenhuis van behandeling (47%) als thuis (41%) gegeven.

Gemiddeld genomen zijn respondenten over alle locaties waar zij een behandeling met medicijnen kregen heel tevreden:

- het ziekenhuis van behandeling **8,7**
- een andere locatie van het ziekenhuis van behandeling (zoals buitenpoli of dependance) **8,9**
- een ander ziekenhuis **7,9**
- thuis **9,0**
- in een gezondheidscentrum (zoals huisartsenpraktijk, buurtpoli, wijkgebouw) **8,6**

Van de respondenten die behandelingen via een infuus, injectie of katheter kregen, kon **12%** (deels) kiezen of dit binnen of buiten het ziekenhuis was.

Als respondenten in de toekomst zouden kunnen kiezen waar zij voor kanker behandeld worden met medicijnen (via infuus, injectie of katheter), dan kiezen zij:



- het ziekenhuis van behandeling **75%**
- een andere locatie van het ziekenhuis van behandeling (zoals buitenpoli of dependance) **12%**
- een ander ziekenhuis **12%**
- thuis **30%**
- in een gezondheidscentrum (zoals huisartsenpraktijk, buurtpoli, wijkgebouw) **14%**

Van de respondenten die 1 locatie aanvinkten, kozen de meesten (71%) het ziekenhuis van behandeling. Van de respondenten die 2 locaties aanvinkten, kozen de meesten het ziekenhuis van behandeling (82%) en thuis (59%).

Opvallend is dat respondenten vaak kiezen voor locaties waar zij al behandeling met medicijnen (infuus, injectie of katheter) krijgen of kregen.

Respondenten gaven als belangrijkste redenen voor de keuze voor de locatie(s) waar ze behandeld zouden (willen) worden:

- deskundigheid van zorgverleners **59%**
- ik wil behandeld worden in een vertrouwde omgeving **34%**
- zorgen om complicaties **32%**
- ik heb geen of minder reistijd **31%**
- de manier waarop de medicijnen worden gegeven (infuus, injectie of katheter) **24%**

‘Als je thuis behandeld wordt, kan je de autorit naar huis, waarin je steeds beroerder wordt, overslaan.’

Als respondenten in de toekomst zouden kunnen kiezen waar zij overige medische zorg (zoals bloedprikken, echo's, wondzorg) krijgen tijdens of na behandeling voor kanker, dan kiezen zij:



- het ziekenhuis van behandeling **71%**
- een andere locatie van het ziekenhuis van behandeling (zoals buitenpoli of dependance) **18%**
- een ander ziekenhuis **14%**
- thuis **19%**
- in een gezondheidscentrum (zoals huisartsenpraktijk, buurtpoli, wijkgebouw, prikpoli, diagnostisch centrum) **32%**